

ATENÇÃO

Informações de segurança, ver no interior
**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
ANTES DE UTILIZAR LEIA ATENTAMENTE AS PÁGINAS INTERIORES DO RÓTULO**

Lote n.º e Data de produção: Ver embalagem

Autorização de Venda n.º 2174 concedida pela DGAV

**Titular da autorização de venda: Corteva Agriscience Portugal, S.A. -
Campo Pequeno, 48-6º, Esq. Edifício Taurus - 1000-081 Lisboa, Portugal -
Tel: +351 217 998 030 - www.corteva.pt**

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 800 250 250

Mantem em local fresco, seco, ventilado e protegido dos raios solares



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

TM® Marcas registadas da Corteva Agriscience e das suas companhias afiliadas

UFI: 4M47-P08C-800V-47WA



Citadel®

HERBICIDA

Suspensão concentrada (SC)
com florasulame 75 g/L
(6,8% p/p) + penoxsulame
150 g/L (13,6% p/p)

Contem: 1,2-benziso-
tiazol-3(2H)-ona



CONTEÚDO: 250 ML e

283075 2310

Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele impresso na embalagem no momento da compra.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



ATENÇÃO

- H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- P261 Evitar respirar a nuvem de pulverização.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P280 Usar luvas de proteção.
P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

- P391 Recolher o produto derramado.
P501a Eliminar o conteúdo e a embalagem num local adequado à recolha de resíduos perigosos.

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

SPe3PT1 Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície.

SPe3PT2 Para proteção das plantas não visadas, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às zonas não cultivadas ou utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 50 % de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto.
SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.

SPoPT4 O aplicador deverá usar: luvas de proteção e vestuário de proteção durante a preparação da calda e aplicação do produto.

SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento, às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele impresso na embalagem no momento da compra.

CITADEL® é um herbicida para o controlo de infestantes de folha larga em pré e pós-emergência precoce em oliveira e citrinos.

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

CITADEL é um herbicida sistémico à base em florasulame e penoxsulame, pertencentes à família química das triazolopirimidinas. É absorvido por via foliar e radicular e inibe a atividade da enzima acetolactato sintase (ALS).

Classificação do modo de ação da substância ativa conforme HRAC

GRUPO	2,2	HERBICIDA
-------	-----	-----------

Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele impresso na embalagem no momento da compra.

UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura	Inimigo	Volume de calda (L/ha)	Dose (L/ha)	Época ou estado fenológico	Técnica e Equipamento de aplicação	Nº máx aplicações	Intervalo de segurança
Oliveira	Infestantes dicotiledóneas anuais	100 - 400	0.08 - 0.1	Aplicar durante todo o ciclo cultural até à maturação dos frutos (BBCH 00 - 89), em pré ou pós-emergência precoce das infestantes, até às 2 folhas.	Pulverização dirigida ao solo (tratando, no máximo, 50% da superfície total) com recurso a pulverizador montado no trator ou com pulverizador de dorso.	1	15
Citrios (todos os citrios e seus híbridos)	Infestantes dicotiledóneas anuais			Aplicar durante todo o ciclo cultural até à maturação dos frutos (BBCH 00 - 89), em pré ou pós-emergência precoce das infestantes, até às 2 folhas.	Pulverização dirigida ao solo (tratando, no máximo, 50% da superfície total) com recurso a pulverizador montado no trator ou com pulverizador de dorso.		30

Infestantes suscetíveis:

Em Citrios: *Amaranthus retroflexus* (bredo), *Portulaca oleracea* (beldroega-comum), *Erigeron bonariensis* (avoadinha-peluda), *Erigeron canadensis* (avoadinha), *Raphanus raphanistrum* (saramago), *Diploaxis erucoides* (gizandra branca), *Sonchus oleraceus* (serralha-branca), *Chenopodium album* (catassol), *Amaranthus blitoides* (erva-aranha), *Malva sylvestris* (malva-comum).

Em Oliveira: *Diploaxis virgata* (gizandra), *Sonchus oleraceus* (serralha-branca), *Sonchus arvensis* (serralha), *Cirsium arvense* (cardo-das-vinhas), *Capsella bursa-pastoris* (bolsa-do-pastor), *Raphanus raphanistrum* (saramago), *Sinapis arvensis* (mostarda-dos-campos), *Erigeron bonariensis* (avoadinha-peluda), *Erigeron canadensis* (avoadinha), *Stellaria*

Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele impresso na embalagem no momento da compra.

media (morugem-branca), *Urtica dioica* (urtiga), *Urtica urens* (urtiga menor), *Calendula arvensis* (malmequer-dos-campos), *Malva neglecta* (malva-redonda), *Malva sylvestris* (malva comum), *Picris echioides* (raspa-saias), *Lamium amplexicaule* (lâmio-violeta).

Infestantes moderadamente suscetíveis: *Euphorbia chiapensis*.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- Manter uma distância mínima de segurança de 5 m entre a cultura tratada e as culturas adjacentes (beterraba, algodão, tomate, girassol, melão e frutas com caroço).
- Para evitar o desenvolvimento de biótipos resistentes não aplicar este herbicida mais de três anos consecutivos nos mesmos solos. De preferência proceder à alternância com outros herbicidas de diferente modo de ação.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogêneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento.

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação.

Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm² e/ou usar bicos anti-arrastamento.

Utilizar a pressão de pulverização e a menor altura de barra possível que garantam uma boa distribuição do herbicida pulverizado.

Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele impresso na embalagem no momento da compra.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E RESTRIÇÕES, RESPEITANTES A TODAS AS FINALIDADES

Aplicar o tratamento em dias aprazíveis, sem vento (ou com ventos que tenham uma velocidade inferior a 5 m/s) e a temperaturas moderadas.

Aplicação em bandas, ocupando máximo 50% da superfície total do terreno.

ADVERTÊNCIA: As recomendações e informação que disponibilizamos são fruto de amplos e rigorosos estudos e ensaios. No entanto, na utilização podem intervir numerosos factores que estão fora do nosso domínio (preparação de misturas, aplicação, condições climáticas, resistências etc.). A empresa garante a composição, formulação e teor. O utilizador será responsável pelos danos causados (falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.) por inobservância total ou parcial das instruções do rótulo.



Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele impresso na embalagem no momento da compra.

ATENÇÃO

Informações de segurança, ver no interior
**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
ANTES DE UTILIZAR LEIA ATENTAMENTE AS PÁGINAS INTERIORES DO RÓTULO**

Lote n.º e Data de produção: Ver embalagem

Autorização de Venda n.º 2174 concedida pela DGAV

**Titular da autorização de venda: Corteva Agriscience Portugal, S.A. -
Campo Pequeno, 48-6º, Esq. Edifício Taurus - 1000-081 Lisboa, Portugal -
Tel: +351 217 998 030 - www.corteva.pt**

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 800 250 250

Mantem em local fresco, seco, ventilado e protegido dos raios solares



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

TM® Marcas registadas da Corteva Agriscience e das suas companhias afiliadas

UFI: 4M47-P08C-800V-47WA



Citadel®

HERBICIDA

Suspensão concentrada (SC)
com florasulame 75 g/L
(6,8% p/p) + penoxsulame
150 g/L (13,6% p/p)

Contem: 1,2-benziso-
tiazol-3(2H)-ona



CONTEÚDO: 250 ML e

283075 2310

Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele impresso na embalagem no momento da compra.