CORTEVA agriscience

Pixxaro®

Arylex™ active

HERBICIDA

Concentrado para emulsão (EC) com 12 g e.a./L ou 1,2 % (p/p) de Halauxifena-metilo, 280 g e.a./L ou 27 % (p/p) de Fluroxipir (na forma de éster-meptiletilico) e 12 g/L ou 1,2 % (p/p) cloquintocete-mexilo

Herbicida para o controlo em pós-emergência de infestantes de folha larga (dicotiledóneas) nas culturas de trigo mole, trigo duro, cevada, espelta, centeio, triticale, aveia de inverno, citrinos e oliveira

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Lote n.º e Data de produção: Ver embalagem

Autorização de venda n.º 1429 concedida pela DGAV

Titular da autorização de Venda:
Corteva Agriscience Portugal, S.A.
Campo Pequeno,48 / 6° Esq., Edifício Taurus, 1000-081 Lisboa, Portugal
Tel: +351 217 998 030
www.corteva.pt

UFI: K1T7-40HU-500N-KGKP

™ ® Marcas registadas da Corteva Agriscience e das suas companhias afiliadas

3 362130 191483 >

CONTEÚDO: 5 L ℮

0287659

2503

Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele impresso na embalagem no momento da compra.

INDICAÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

O **PIXXARO®** é um herbicida de pós-emergência para o controlo de infestantes dicotiledóneas para todas as variedades de trigo mole, trigo duro, cevada, espelta, centeio, triticale, aveia de inverno, citrinos e oliveira.

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

Classificação do modo de acção da substância activa conforme HRAC:

GRUPO	4, 4	HERBICIDA

UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

- **Citrinos:** laranjeira, toranjeira, limoeiro, lima, tangerineira (inclui clementina e híbridos). Aplicar em qualquer fase de desenvolvimento da cultura. 1 aplicação em qualquer época do ano com intervalo de segurança: 7 dias. Aplicação localizada (inferior a 50% da superfície total). Aplicação foliar em pósemergência das infestantes. Aplicação com trator ou pulverizador de dorso. Dose 0,4-0,7 L/ha. Volume de calda: 100-400 L/ha.
- **Oliveira** (*Olea europaea*) Azeitona de mesa e azeitona para azeite. Aplicar em qualquer fase de desenvolvimento da cultura. 1 aplicação em qualquer época do ano com intervalo de segurança: 7 dias. Aplicação localizada (inferior a 50% da superfície total). Aplicação foliar em pósemergência das infestantes. Aplicação com trator ou pulverizador de dorso. Dose 0,4-0,7 L/ha. Volume de calda: 100-400L/ha.

Como boa prática agrícola, recomenda-se não colher azeitona caída ao chão em zona tratada.

- **Cereais de inverno** (Trigo mole, trigo duro, cevada, espelta, centeio, triticale). Desde desenvolvimento da terceira folha até folha em bandeira. 1 aplicação/ano. Dose: 0,5 L/ha. Volumen de calda: 100-400 L/ha. Intervalo de Reentrada: 2 dias.

Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele impresso na embalagem no momento da compra.

- **Aveia de inverno:** Desde desenvolvimento da terceira folha até início do encanamento. Não aplicar em aveia de primavera. 1 aplicação/ano. Dose: 0,25 L/ha. Volumen de calda: 100-400 L/ha. Intervalo de Reentrada: 2 dias.

O momento ideal para a realização do tratamento é quando as infestantes são pequenas e se encontram em crescimento ativo.

Infestantes susceptíveis: erva-moleirinha (*Fumaria officinalis*), amor-de-hortelão (*Galium aparine*), lâmio-roxo (*Lamium purpureum*), ambrósia (*Ambrosia artemisiifolia*), bolsa-do-pastor (*Capsella bursa-pastoris*), fidalguinhos (*Centaurea cyanus*), coentrinho (*Geranium dissectum*), papoila-das-searas (*Papaver rhoeas*), morugem-branca (*Stellaria media*), batateira *Solanum tuberosum*, catassol (*Chenopodium album*), corriola-bastarda (*Fallopia convolvulus*), sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), *Erigeron* spp., *Malva* spp., beldroega (*Portulaca oleracea*), urtiga-menor (*Urtica urens*), *Sonchus* spp.

CULTURAS ADJACENTES

Para evitar a deriva da pulverização para as culturas adjacentes recomenda-se aplicar só quando as condições atmosféricas sejam favoráveis e quando a velocidade do vento seja inferior a 18 km/h e a temperatura seja inferior a 25°C à sombra.

Durante a aplicação é importante utilizar bicos adequados e manter uma distância mínima de segurança de 5 m relativamente a outras culturas suscetíveis, como vinhas, fruteiras, hortícolas, girassol, legumes, tabaco, linho, ornamentais, beterraba sacarina, batateira, etc.

Se a aplicação é efetuada em pré-emergência ou antes da sementeira das culturas acima referidas não é necessária esta distância de segurança.

CULTURAS SEGUINTES

Depois de uma aplicação em cereais, pode-se cultivar qualquer uma das culturas que se cultivam normalmente. Se a cultura seguinte é semeada antes de decorridos 3 meses sobre a colheita recomenda-se mobilizar o solo antes da sementeira ou consultar o Serviço Técnico da Corteva Agriscience.

Tendo em conta a persistência do metabolito fluroxipir metoxipiridina e a ausência de dados toxicológicos deste metabolito, as culturas de raízes e tubérculos não devem ser consideradas na rotação cultural nos 10 meses a seguir à aplicação de **PIXXARO**.

Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele impresso na embalagem no momento da compra.

CULTURAS DE SUBSTITUIÇÃO

No caso de ser necessário uma cultura de substituição após a aplicação de **PIXXARO** podem-se semear as seguintes culturas:

- 1 mês depois da aplicação: trigo, cevada, aveia de primavera, colza de Primavera, azevém e milho.
- 2 mês depois da aplicação: ervilheira forrageira após uma mobilização mínima do solo.

Antes de semear qualquer outra cultura consultar o Serviço Técnico da Corteva Agriscience.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- Não se deve tratar com **PIXXARO** culturas sob condições de stress (por exemplo seca, encharcamento, temperaturas extremas, deficiências nutricionais, problemas fitossanitários, etc).
- Ocasionalmente, **PIXXARO** pode provocar um ligeiro amarelecimento transitório (entre 2 e 3 semanas), sem afetar o rendimento da colheita e a qualidade do grão.
- Não deve aplicar-se em culturas de cereais em mistura com leguminosas (ervilhaca, trevo, etc.).
- **PIXXARO** pode ser aplicado com temperaturas compreendidas entre 2 e 25°C.
- Em condições de seca pode observar-se uma ligeira redução na eficácia do produto.
- O **PIXXARO** é resistente à precipitação ocorrida uma hora após a sua aplicação.
- Não utilizar **PIXXARO** em pomares de citrinos e olival com menos de 4 anos.
- Não molhar as árvores, especialmente os novos rebentos.

MODO DE AÇÃO E MANUSEAMENTO DE RESISTÊNCIAS

Devem ser tomadas as seguintes precauções:

1. Utilizar a dose que permita o controlo de todas as infestantes alvo.
2. Seguir as indicações do rótulo relativamente à dose e época de aplicação.
3. Considerar o uso de métodos culturais de controlo de infestantes e efetuar rotação de culturas de modo a prevenir o desenvolvimento de biótipos resistentes.
4. Recomenda-se proceder à alternância com herbicidas de diferentes modos de ação. O controlo químico das infestantes não deve basear-se num único modo de ação.

Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele impresso na embalagem no momento da compra.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação continua.
Utilizar sempre água limpa. Preparar a calda imediatamente antes da aplicação.
Calibrar corretamente o equipamento.
Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm^2 e/ou usar bicos anti-arrastamento.

LIMPEZA DO TANQUE DO PULVERIZADOR

Todos os equipamentos de pulverização devem ser limpos minuciosamente, tanto por dentro como por fora, para evitar possíveis danos posteriores.
Enxaguar cuidadosamente o tanque e o equipamento de pulverização depois da aplicação: primeiro com água limpa, em seguida encher o tanque e adicionar 0,5 L de lixívia por cada 100 L de água e, finalmente, lavar novamente com água limpa.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA COMPLEMENTARES

Frases-Tipo Suplementares

SP1	Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
Spe1	Para proteção dos organismos do solo, a aplicação deste produto deve ser localizada atingindo uma área máxima de 50% da superfície total, em citrinos e oliveira. Aplicação foliar em pós-emergência das infestantes.
Spe3	Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 5 m em relação às águas de superfície.
Spe3	Para proteção das plantas não visadas, respeitar uma zona não pulverizada de 5 m em relação às zonas não cultivadas, em cereais.
Spe3PT2	Para proteção das plantas não visadas, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às zonas não cultivadas, ou sempre que possível, utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 75% de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto, podendo reduzir a zona não pulverizada para 1 metro em relação às zonas não cultivadas, em citrinos e oliveira.

Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele impresso na embalagem no momento da compra.

Spe8	Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas. Não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos, em citrinos e oliveira.
SPoPT4	O aplicador deverá usar: luvas de protecção, vestuário de protecção, protecção ocular e protecção facial durante a preparação da calda e aplicação do produto.
SPoPT5	Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
SPoPT6	Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Anti Venenos, Telef: 800 250 250
Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares

valorfito

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda

ADVERTÊNCIA: As recomendações e informação que disponibilizamos são fruto de amplos e rigorosos estudos e ensaios. No entanto, na utilização podem intervir numerosos fatores que estão fora do nosso domínio (preparação de misturas, aplicação, condições climáticas, resistências, etc.). A empresa garante a composição, formulação e teor. O utilizador será responsável pelos danos causados (falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.) por inobservância total ou parcial das instruções do rótulo.

Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele impresso na embalagem no momento da compra.

CORTEVA agriscience

Pixxaro®

Arylex™ active

HERBICIDA

Concentrado para emulsão (EC) com 12 g e.a./L ou 1,2 % (p/p) de Halauxifena-metilo, 280 g e.a./L ou 27 % (p/p) de Fluroxipir (na forma de éster-meptiletilico) e 12 g/L ou 1,2 % (p/p) cloquintocete-mexilo

Herbicida para o controlo em pós-emergência de infestantes de folha larga (dicotiledóneas) nas culturas de trigo mole, trigo duro, cevada, espelta, centeio, triticale, aveia de inverno, citrinos e oliveira

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Lote n.º e Data de produção: Ver embalagem

Autorização de venda n.º 1429 concedida pela DGAV

Titular da autorização de Venda:
Corteva Agriscience Portugal, S.A.
Campo Pequeno,48 / 6° Esq., Edifício Taurus, 1000-081 Lisboa, Portugal
Tel: +351 217 998 030
www.corteva.pt

UFI: K1T7-40HU-500N-KGKP

™ ® Marcas registadas da Corteva Agriscience e das suas companhias afiliadas

3 362130 191483 >

Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele impresso na embalagem no momento da compra.

CONTEÚDO: 5 L ℮

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



ATENÇÃO

Advertências de Perigo

H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Recomendações de Prudência

P261	Evitar respirar a nuvem de pulverização.
P270	Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P271	Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados
P280	Usar luvas de proteção e vestuário de protecção, protecção ocular e protecção facial.
P302+P352	SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.
P305+P351+P338	SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P312	Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P333+P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
P337+P313	Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P362+P364	Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.
P391	Recolher o produto derramado
P403+P233	Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.
P405	Armazenar em local fechado à chave.
P501a	Eliminar a embalagem em locais adequados à recolha de resíduos perigosos.

Informações Suplementares

EUH210	Ficha de segurança fornecida a pedido

Informações de segurança complementares, consultar o interior do contra-rótulo

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Anti Venenos, Telef: 800 250 250
Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo atual do produto é aquele impresso na embalagem no momento da compra.