

Boavin™

HERBICIDA

O complemento perfeito para
uma vinha sem infestantes



Boavin™ é um herbicida para o controlo em pré e pós emergência precoce das infestantes na vinha.

Composição: 20 g/L ou 2,1% (p/p) de penoxsulame. Dispersão oleosa (OD).

Graças à sua persistência, inibe a germinação de plântulas após alguns meses da aplicação.

Infestantes suscetíveis:

Catassol (*Chenopodium album*), Moncos-de-perú (*Amaranthus retroflexus*), Coniza (*Erigeron spp.*) e Tasneirinha (*Senecio vulgaris*).

Infestantes moderadamente suscetíveis:

Erva-moira (*Solanum nigrum*).



1. *Erigeron spp.*
2. *Amaranthus retroflexus*
3. *Chenopodium album*
4. *Solanum nigrum*
5. *Senecio vulgaris*

CULTURA	INFESTANTES	ÉPOCA DE APLICAÇÃO	DOSE	RECOMENDAÇÃO DE VOLUME DE CALDA	Nº MÁX. APLICAÇÕES/ANO	INTERVALO DE SEGURANÇA
Videira	Infestantes anuais	Aplicar antes ou após a rebentação da vinha e até ao estado de botões florais aglomerados (BBCH 55).	0.35-0.75 l/ha	100-300 l/ha	1	56

Outras recomendações

Aplicar com o solo húmido ou com previsão de chuva após tratamento (10-20 mm).

As aplicações em pós-emergência devem ser realizadas no máximo até à fase cotiledonar das infestantes suscetíveis.

Na dose recomendada, o **Boavin™** é seletivo para todas as variedades de videira, plantadas há pelo menos 4 anos, sem restrição do tipo de solo.

É aconselhável associar **Boavin™** com outro herbicida de ação anti-germinativa a fim de aumentar o seu espectro de atividade e prolongar a sua ação, e/ou combinar com um herbicida foliar para eliminar as infestantes de folha estreita nascidas e folha larga mais desenvolvida no momento da aplicação.

Para a realização de misturas consulte o serviço técnico da Corteva Agriscience.

4 Vantagens de usar o Boavin®

- Nova família química na vinha
- Seletivo
- Flexível
- Solução eficaz e económica

