

# Contrast<sup>®</sup>

## INSETICIDA

- Modo rápido de ação.
- Forte efeito de choque.
- Amplo registo de culturas autorizadas.



A formulação que supera  
todas as outras pela sua  
qualidade



**CORTEVA**<sup>™</sup>  
agriscience

Visite-nos em: [corteva.pt](https://corteva.pt)


®™, SM são marcas comerciais ou de serviço da Corteva Agriscience™ e das suas empresas afiliadas ou dos seus respectivos proprietários. ©2021 Corteva Agriscience™.

**CONTRAST: Deltametrina 2,5 g/l (EC)**

- Piretróide sintético com atividade inseticida (MoA IRAC Grupo 3A), atua no sistema nervoso do inseto. Contato e atividade de ingestão.
- Substância ativa lipofílica que facilita a penetração na cutícula do inseto e a sua adesão à epiderme das plantas tratadas.

**Características principais**

- Uso autorizado em várias culturas
- Amplo espectro de ação (lagartas, afídeos, ...)
- Efeito de choque, velocidade de ação
- Boa persistência (alta fotoestabilidade)
- Resistência à lavagem (lipofílico)



<b>Cultura</b>	<b>Praga</b>
<b>Alface (ar livre)</b>	Nóctuas ( <i>Chrysodeixis chalcites</i> , <i>Spodoptera exigua</i> , <i>Agrotis sp.</i> )
<b>Trigo, cevada, aveia e centeio</b>	Lagarta sete coiros ( <i>Ocnogyna baetica</i> )
<b>Batateira</b>	Escaravelho da batateira ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )
<b>Cerejeira</b>	Mosca da cereja ( <i>Rhagoletis cerasi</i> )
<b>Couve-de-repolho, couve-brócolo e couve-flor</b>	Lagartas ( <i>Pieris sp.</i> ), Nóctua da couve ( <i>Mamestra brassica</i> ), Nóctuas ( <i>Agrotis sp.</i> , <i>Autographa gamma</i> )
<b>Couve-de-repolho</b>	Traça-da-couve ( <i>Plutella xylostella</i> )
<b>Ervilheira (ar livre)</b>	Traça da ervilha ( <i>Cydia nigricana</i> )
<b>Feijoeiro, faveira (ar livre)</b>	Afídeo verde do pessegueiro ( <i>Myzus persicae</i> ), Afídeos ( <i>Aphis sp.</i> )
<b>Macieira e Pereira</b>	Bichado da fruta ( <i>Cydia pomonella</i> ), Afídeo verde ( <i>Aphis pomi</i> )
<b>Pereira</b>	Psila da pereira ( <i>Psylla pyri</i> )
<b>Pessegueiro</b>	Afídeo verde do pessegueiro ( <i>Myzus persicae</i> )
<b>Oliveira</b>	Mosca da azeitona ( <i>Bactrocera oleae</i> )
<b>Tomateiro (ar livre e estufa)</b>	Lagarta do tomate ( <i>Helicoverpa armigera</i> ), Nóctuas ( <i>Spodoptera sp.</i> ), Mosca branca das estufas ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )
<b>Videira</b>	Traça dos cachos ( <i>Lobesia botrana</i> ), Cicadela da vinha ( <i>Empoasca sp.</i> ) (* Utilizações menores: Cicadélido da flavescência dourada ( <i>Scaphoideus titanus</i> ))

(\*) A eficácia e fitotoxicidade resultantes destas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto fitofarmacêutico.