



# Sem infestantes... desde o início!

**Gallery**<sup>®</sup>  
HERBICIDA

**Um passo à frente no controlo das infestantes com o herbicida mais residual e mais selectivo!!!**

A solução de pré-emergência para o controlo de folha larga na vinha. A maior persistência e melhor seletividade mesmo em plantações novas.

AUTORIZADO  
EM  
**VINHA**  
PLANTAÇÕES NOVAS

modo de  
AÇÃO **ÚNICO** 

 **CORTEVA**<sup>™</sup>  
agriscience

Visite-nos em: [corteva.pt](https://corteva.pt)

Esta informação pode não estar atualizada. Com a finalidade de evitar riscos para as pessoas e o meio ambiente leia atentamente o rótulo do produto e siga estritamente as instruções de uso.  
®.™.SM São marcas comerciais ou de serviço da Corteva Agriscience e das suas empresas afiliadas. ©2023 Corteva Agriscience™.

Poupe tempo e fique à frente das infestantes com o modo de AÇÃO **ÚNICO**

Alta seletividade desde o primeiro ano da vinha

Elevada peristência (até 6 meses)

Melhor implantação da cultura

### Espetro de controlo

#### Suscetíveis:



*Anthemis arvensis*



*Capsela bursa-pastoris*



*Chenopodium album*



*Diplotaxis erucoides*



*Papaver rhoeas*



*Raphanus raphanistrum*



*Sinapis arvensis*



*Urtica urens*

#### Moderadamente suscetíveis:



*Fallopia convulvulus*



*Polygonum aviculare*



*Sonchus asper*

CULTURA	INFESTANTES	ÉPOCA DE APLICAÇÃO	DOSE	RECOMENDAÇÃO DE VOLUME DE CALDA	Nº MÁX. APLICAÇÕES/ ANO
Videira	Infestantes dicotiledóneas anuais	Em vinhas em produção aplicar desde o repouso vegetativo até às 4 folhas visíveis (BBCH 00-14). Em vinhas jovens, e que ainda não entraram em produção, aplicar o produto desde o repouso vegetativo até ao final da floração (BBCH 00-69)	1,2 – 1,5 l/ha	100-200 l/ha	1
Citrinos (Laranja, Mandarina, Limoeiro, Toranja, Limeira)		Aplicar desde o final do Outono até ao início da Primavera (BBCH 00)	0,9 l/ha	100 – 400 L/ha	
Pomoideas (Macieira, Pereira, Pêra-nashi, Marmeleiro, Nespereira)		Aplicar desde o repouso vegetativo até ao final da floração (BBCH 00-69)	1,2 l/ha		
Prunoideas (Pessegueiro, Damasqueiro, Ameixeira, Cerejeira, Ginjeira)		Aplicar desde o repouso vegetativo até ao final da floração (BBCH 00-69)			

INTERVALO DE SEGURANÇA: não procede

### Cómo usar Gallery® na vinha?



- Aplicar à dose de 1,2-1,5 l/ha. Dirigir a pulverização ao solo sobre a linha de plantação aplicando um máximo de 30% da superfície.
- Aplicar com o solo limpo de infestantes e em pré-emergência das infestantes alvo.
- Em vinhas jovens aplicar desde o repouso vegetativo até ao final da floração.
- Em vinhas em produção aplicar desde o repouso vegetativo até às 4 folhas.



- Para que comece a atuar, o **Gallery®** deve ser incorporado com água de rega ou com chuva após aplicação.
- É compatível com outros herbicidas. Recomendamos a mistura com **Kerb®FLO** para o controlo completo das infestantes (folha larga e folha estreita), incluindo Joio resistente.
- A eficácia do herbicida pode diminuir se for aplicado após a realização de uma fertilização orgânica.