

Nova estratégia no controlo do Lolium, atreve-te!

Kerb[®] FLO

HERBICIDA

**Controla o Lolium resistente
com um modo de ação
diferente, no momento certo**

A solução de pré e pós-emergência para o controlo em infestantes de folha estreita e algumas de folha larga na vinha. Maior persistência e melhor seletividade, mesmo em plantações novas.

AUTORIZADO
EM
WNHA
PLANTAÇÕES NOVAS

modo de
AÇÃO **ÚNICO**

 **CORTEVA**[™]
agriscience

Visite-nos em: corteva.pt

Esta informação pode não estar atualizada. Com a finalidade de evitar riscos para as pessoas e o meio ambiente leia atentamente o rótulo do produto e siga estritamente as instruções de uso.
®™, SM São marcas comerciais ou de serviço da Corteva Agriscience e das suas empresas afiliadas. ©2023 Corteva Agriscience™.

Poupe tempo e fique à frente das infestantes com o modo de AÇÃO ÚNICO

Alta seletividade desde o primeiro ano da vinha

Evita o problema do Lolium resistente ao glifosato e sulfonilureas desde o início

Reduz o banco de sementes

Espectro de controlo



Lolium spp.



Bromus spp.



Poa spp.



Stellaria spp.



Plantago spp.



Fumaria spp.



Equisetum arvense



Urtica spp.

CULTURA	DOSE	ÉPOCAS DE APLICAÇÃO
Videira	1,875 l/ha	<p>A partir do outono/inverno seguinte à plantação</p> <p>KERB FLO é selectivo para a vinha (qualquer que seja a sua idade e variedade). O período de utilização estende-se desde o fim de Outubro a Janeiro.</p>

Como usar Kerb®FLO na vinha?



■ Aplicar à dose de 1,875 l/ha. Dirigir a pulverização ao solo sobre a linha de plantação.

■ Para obter uma boa eficácia, **Kerb®FLO** deve ser aplicado em pré-emergência e/ou pós-emergência precoce das infestantes.



■ O momento óptimo para sua aplicação ocorre durante os meses de Outono/Inverno, com temperaturas do solo inferiores a 8°C.



■ Para o bom funcionamento de **Kerb®FLO**, é necessário uma boa incorporação no solo. Recomenda-se a aplicação de Kerb Flo quando houver previsão de chuvas ou geadas que assegurem um nível de humidade suficiente no solo.

■ É compatível com outros herbicidas. Recomendamos a mistura com **Gallery®** para o controlo completo das infestantes (folha larga e folha estreita).

■ A eficácia do herbicida pode diminuir se for aplicado após a realização de uma fertilização orgânica.