

NOVO



O nosso campo, o nosso futuro.

Quelex[®]

Arylex[™] active

HERBICIDA

**Marque a diferença e mantenha o
seu campo limpo com Quelex[®].**

**Quelex[®] é o herbicida de pós-emergência para
o controlo de infestantes de folha larga em
cereais.**

Quelex®: Escolha ser diferente

Arylex™ active

Nova matéria ativa.

Modo de ação diferenciado.

- Faça a diferença com **Quelex®** e mantenha o seu campo limpo graças à sua matéria ativa **Arylex™**.
- **Quelex®** e os seus dois modos de ação, atrasam e minimizam o desenvolvimento da resistência das infestantes.
- **Quelex®** ajuda a conseguir um melhor controlo das infestantes de folha larga e uma maior rentabilidade presente e futura.



Quelex®: Condições de utilização


CULTURAS	DOSES	MOMENTO DE APLICAÇÃO
Cereais de inverno (trigo, cevada, centeio e tritcale)	50 g/ha	Aplicação em separado, desde o início do afilamento até ao final do emborrachamento (BBCH 21-45)
	40 g/ha	Aplicação em mistura com outro herbicida de folha larga, desde o início do afilamento até ao final do emborrachamento (BBCH 21-45)
Cereais de primavera (trigo, cevada e centeio)	50 g/ha	Aplicação em separado ou em mistura com outro herbicida de folha larga, desde as 3 folhas até ao final do emborrachamento (BBCH 13-45)
Aveia de inverno	30 g/ha	Aplicação em separado ou em mistura com outro herbicida de folha larga, desde o início do afilamento até ao final do emborrachamento (BBCH 21-45)

A adição de molhante permite otimizar os resultados

Quelex® : Momento de aplicação recomendado

Aplicar **Quelex®** durante o afilamento da cultura, com as infestantes no estado de roseta ou inferior (BBCH ≤ 30).

ESTADO ÓTIMO DAS INFESTANTES:
2-8 folhas (Menos de 10 cm altura)



Quelex®: amplo espectro de controlo

É EFICAZ NAS INFESTANTES DE FOLHA LARGA MAIS IMPORTANTES DOS CEREAIS




ESPÉCIE	NOME COMUM
<i>Anagallis arvensis</i>	Morrião, Morrião-dos-campos
<i>Anthemis arvensis</i>	Falsa-camomila, Margação
<i>Bifora radians</i>	Bifora
<i>Brassica napus</i>	Colza
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa-de-pastor
<i>Centaurea cyanus</i>	Centáurea
<i>Chenopodium album</i>	Catasol, Erva-couvinha
<i>Descurainia sophia</i>	Erva-Sofia, Sofia-dos-cirurgiões
<i>Diplotaxis virgata</i>	Gizandra
<i>Fumaria officinalis</i>	Fumária, Erva-moleirinha
<i>Galium aparine</i>	Amor-de-hortelão, Erva peganhosa
<i>Geranium pusillum</i>	Bico de guindaste de flor pequena

ESPÉCIE	NOME COMUM
<i>Lamium amplexicaule</i>	Urtiga morta
<i>Lamium purpureum</i>	Lâmio-roxo
<i>Lithospermum arvense</i>	Aljofareira
<i>Matricaria chamomilla</i>	Camomila, Camomila-alemã
<i>Matricaria inodora</i>	Falsa camomila
<i>Myosotis arvensis</i>	Miosótis-dos-campos, Não-me-esqueças
<i>Papaver rhoeas</i>	Papoila-brava, Papoila-das-searas
<i>Polygonum convulvulus</i>	Corriola-bastarda
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Saramago, Cabrestos
<i>Ridolfia segetum</i>	Andragem, Endro
<i>Sinapis arvensis</i>	Mostarda-dos-campos
<i>Stellaria media</i>	Morugem-branca

67 ensaios Portugal e Europa 2014-2019

QUELEX + MOLHANTE



Quelex®: faça a gestão da sua exploração com liberdade

PODE FAZER A ROTAÇÃO COM QUALQUER CULTURA



Beterraba



Colza



Luzerna



Batata



Girassol



Milho



Hortícolas



Leguminosas

Quelex®: Formulação com tecnologia GoDRI™

PATENTEADA PELA CORTEVA AGRISCIENCE



- Melhora a dissolução a frio (até 5°C).
- Diminui o tempo de preparação da mistura no tanque.
- Consegue aplicações mais uniformes e eficazes.



Quelex®: Quer reduzir o número de aplicações?

COMPATÍVEL EM MISTURAS.



- **Quelex®** mistura com fungicidas, inseticidas e outros herbicidas de folha larga e anti-gramineas.

Quelex®: eficaz em condições climáticas diversas

EFICAZ INCLUSIVE A BAIXAS TEMPERATURAS.



- As aplicações são eficazes com temperaturas entre 2 – 25 °C



Quelex®: controlo mais rápido

CONTROLA DE FORMA RÁPIDA E FLEXÍVEL AS INFESTANTES.



- **Quelex®** permite-lhe fazer tratamentos durante toda a fase de afilhamento dos cereais, embora recomendemos tratar sempre as infestantes o mais cedo possível (2-8 folhas).



- Além disso, **Quelex®** é muito rápido no controlo de infestantes. Os primeiros sintomas são visíveis em poucos dias.



Amor-de-hortelão e margarida em 20 dias



Fumária em 14 dias

Quelex®: vantagens e benefícios



Arylex™:
Modo de ação
auxínico
diferenciado



Gestão de
resistências

2 modos
de ação

Baixa
volatilidade



Amplo
espectro de
ação



Eficaz em
condições
climáticas
diversas

Controlo
superior de
amor-de-
hortelão, fumária
e papoila

Controlo
robusto de
infestantes
difíceis

Permite a
rotação com
qualquer
cultura



Seletividade

Formulação
GoDRI™,
melhor
dissolução a
frio



Ampla
gama de
aplicação



Compatível
com misturas



Para mais informação e
aconselhamento técnico,
utilizar este código.

Esta informação pode não estar atualizada. Leia atentamente o rótulo do produto e siga estritamente as instruções de uso.