



PRECAUÇÕES A INCLUIR EM EMBALAGENS DE SEMENTES TRATADAS COM LUMIPOSA®

Esta semente foi tratada com Corteva Agriscience™ LUMIPOSA®, um produto para tratamento de sementes para o controle de alfinetes (*Agriotes spp.*) e nóctuas (*Agrotis spp.*).

Autorização de Emergência n.º 2020/27

LUMIPOSA® contém ciantraniliprol, um inseticida diamida antranílico, classificado como um inseticida IRAC Grupo 28 (moduladores do receptor de rianodina – diamidas). Atua ativando os moduladores do receptor de rianodina, causando a contração e paralisia dos músculos.

Densidade de sementeira máxima de 90.000 sementes / hectare;

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

SEMENTES TRATADAS COM CIANTRANILIPROL IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL, DESTINADAS APENAS PARA SEMEITEIRA

Quando abrir o saco das sementes tratadas e encher a tremonha do semeador ou quando esvaziar o semeador, evitar a exposição ao pó.

Evitar o contacto com a pele, não respirar as poeiras e não comer beber ou fumar durante o manuseamento das sementes tratadas ou durante a sementeira.

Durante o manuseamento das sementes tratadas, limpeza do semeador e no caso de sementeira manual, usar fato de proteção, máscara de pó e luvas de borracha.

Manter afastado de alimentos, bebida e rações.

A semente tratada deve ser armazenada em ambiente fresco, seco e ventilado. Um armazenamento fora das condições adequadas pode afetar negativamente a germinação, o vigor ou a qualidade da colheita, estando fora do controle da empresa Corteva.

Não utilizar os sacos de sementes tratadas para outros fins.

Após o manuseamento de sementes tratadas ou sementeira, lavar-se bem com água corrente. Após cada utilização lavar bem o material de proteção tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado.

Não poluir a água com as sementes tratadas ou com a sua embalagem;

Para protecção das aves e mamíferos, incorporar totalmente as sementes no solo, incluindo no final dos sulcos;

Parar a sementeira em condições atmosféricas muito ventosas, para evitar o arrastamento de poeiras para as culturas vizinhas;

No uso de semeador pneumático, este deve estar equipado com um defletor que direcione o fluxo do ar para o sulco no solo;

Melhores práticas para evitar o desenvolvimento de resistência:

- Evite usar o mesmo modo de ação (mesmo número de grupo IRAC) em gerações consecutivas de pragas de insetos.
- Incluindo o tratamento de sementes LUMIPOSA®, não faça mais do que duas aplicações de ciantraniliprol ou outros produtos do Grupo 28 por geração para a mesma espécie de inseto em uma cultura ou dentro de um período de 30 dias (conte a data da sementeira como dia 1 se estiver usando semente tratada).

Se tiver dificuldade no controle da resistência, consulte imediatamente o representante local da empresa ou consultor agrícola para obter o melhor método alternativo de controle para sua área.